

Příloha k protokolu o SZZ č.

Vysoká škola: JU v Č. Budějovicích

Pedagogická fakulta

Katedra: geografie

Datum odevzdání posudku: 11.05. 2006

Diplomant: David Fryšonc

Aprobace: Ze - Bi

Vedoucí diplomové práce:

Mgr. Jiří Ryppl

POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE

Geomorfologické mapování vybraných částí Soběnovské vrchoviny
(téma)

.....

Diplomová práce je napsána na 75 stranách a je rozdělena do osmi kapitol včetně úvodu a závěru, dále obsahuje seznam literatury a seznam příloh a vlastní vázané přílohy. Nedílnou a nezbytnou součástí diplomové práce jsou tři volné přílohy. Mapové přílohy v měřítku 1 : 25 000, mapové listy 32 – 242 Trhové Sviny a 32 – 244 Benešov nad Černou, do kterých jsou ve vymezeném území (hranice geomorfologického okrsku Slepíčí hory a Dluhošská kotlina) zaneseny geomorfologické jevy. Třetí volnou přílohou je legenda k předcházejícím geomorfologickým mapám.

První tři kapitoly diplomové práce lze považovat za vstupní kapitoly do problematiky geomorfologického vývoje zkoumané oblasti. Kromě úvodu, v nich autor jasně a dostatečně popisuje metodiku a cíle práce, popisuje vymezení své zkoumané oblasti, a seznamuje s dosavadními geomorfologickými výzkumy, které dosud v oblasti Novohradských hor proběhly. Nedomnívám se však, že se autorovy podařilo postihnout všechny výzkumy, které kdy byly v Novohradských horách provedeny.

Čtvrtá kapitola diplomové práce nás seznamuje s obecnou fyzickogeografickou charakteristikou Novohradských hor. Autor nás postupně seznamuje s geologickými poměry, geomorfologickými poměry, hydrologickými poměry, klimatickými poměry, půdními poměry a biogeografickými poměry. Jednotlivé fyzickogeografické složky jsou přehledně a dostatečně zpracovány pro potřeby diplomové práce.

Pátá kapitola diplomové práce, tzv. speciální, se již zabývá jednotlivými geomorfologickými tvary, které byly ve zkoumané oblasti nalezeny. Nejdříve se autor zabývá geomorfologickými tvary jejichž vznik je podmíněn endogenními činiteli. Na zájmovém území se vesměs jedná o svahy sklonitosti 10 – 20 ° a nad 20 °. Do skupiny endogenních tvarů by se také nechali zařadit exfoliační tvary ze skupiny tvarů „Periglaciální tvary“. Další velkou skupinou geomorfologických tvarů jsou tvary jejichž vznik je podmíněn exogenními činiteli. Tato velká skupina tvarů je rozdělena na tvary destrukční a akumulační a zařazena do skupiny tvarů podle toho jaká konkrétní exogenní geomorfologická síla na vznik geomorfologických tvarů měla vliv. Předposlední skupinou tvarů jsou tvary antropogenní a do skupiny „Jiných tvarů“ jsou pak zařazeny rašeliniště, umělé vodní nádrže, prameny, skalní mísy a protržená hráze. Z výše popsaného je zřejmé, že každý tvar je určen z genetického

hlediska. V textu potom vyčteme, že u většiny geomorfologických tvarů je také provedena jejich morfometrie.

Závěrečné tři kapitoly (šestá,, sedmá a osmá) lze považovat za shrnující kapitoly diplomové práce. Autor postupně interpretuje příčné profily, které v zájmové oblasti sestrojil, zabývá se vlivy, které působí na kryogenní činnost a vše následně shrnuje v přehledném závěru.

Důležitým doplňkem diplomové práce jsou volné mapové přílohy, které jsou doplněny také o přílohy vázané. Volné mapové přílohy jsou vlastní obecné geomorfologické mapy doplněné o legendu geomorfologické mapy. Vázané přílohy potom vhodně doplňují text diplomové práce, obsahují puklinové diagramy jednotlivých lokalit a podrobněji nás seznamují se zajímavými lokalitami Slepíčních hor.

Diplomant během zpracovávání diplomové práce prokázal, že je schopen samostatně pracovat, především v poměrně složitém terénu. Diplomovou práci včetně obecných geomorfologických map považuji za zdařilé a relevantní možností, kterými diplomant disponoval. Doporučuji jí k obhajobě a hodnotím známkou výborně.

Návrh na klasifikaci diplomové práce: v ý b o r n ě

.....
Podpis vedoucího diplomové práce

V Č. Budějovicích dne: 11.05. 2006

Stupeň klasifikace	v ý b o r n ě	velmi dobře	dobře	nevyhověl
--------------------	---------------	-------------	-------	-----------