

Průběh obhajoby bakalářské práce:

Vliv druhové skladby na socialitu papoušků rodu ara ve smíšených voliérách.

Studentka nejprve komisi obeznámila s kontextem vypracování bakalářské práce (změna vedoucího práce), jejími cíli.

Následovalo seznámení s prací formou PP prezentace. V jejím úvodu byly představeny druhy, na něž se práce zaměřovala. Další snímky prezentace byly věnovány konkrétnímu řešení voliéry pro představené druhy.

V závěru prezentace studentka uvedla dosažení cílů - harmonizace smíšeného hejna arů (alespoň po dobu před hnízdní sezónou), získání zkušenosti, resp. návodu jak v takových případech postupovat. Konkrétním výstupem je zamýšlen odborný článek v chovatelských časopisech zaměřených na exotů.

Při prezentaci práce byl dodržen požadovaný časový rozsah. Projev studentky byl plynulý, samostatný a však s občasným použitím hovorových výrazů. Po odborné stránce odpovídal chovatelskému zaměření práce.

Předseda zkušební komise jí přečetl oba posudky (oponenta i vedoucího práce), včetně otázek v nich uvedených. Odpovědi na ně měla studentka připravena formou krátké prezentace. Odpovědi byly obsáhlé. Byla v nich zohledněna osobní zkušenost i konzultované zkušenosti jiných chovatelů.

Předseda komise zahájil rozpravu k obhajobě práce:

Doc. Berec se dotázal zda se chování ptáci po vypuštění do společné voliéry vracejí pouze do svých budek/dutin, nebo mají snahu obsazovat cizí hnízdní možnosti. Studentka odpověděla, že ano, že si své hnízdo pamatují, a případně si je i brání vůči ostatním.

Prof. Šoch se dotázal zda plánují do voliéry i drobnější ptáky, např. pěvce. Studentka odpověděla, že drobné ptáky ne, protože voliéra má velká oka u pletiva. Prof. Šoch s docentem Novákem navázali krátkou diskuzi se studentkou, jak tedy zajistit prevenci před nákazou chovu ptačí chřipkou, jež by do chovu v takových voliérách mohli zavléct volně žijící ptáci. Studentka uvedla některá jimi aplikovaná opatření jako přednostní krmení ptáků v zázemí voliér - zbytky potravy tak nejsou snadným zdrojem pro volně žijící ptáky a tím pádem důvodem k pronikání do voliéry. U druhů, které jsou ve voliéře i v zimním období (nestor kea) jsou voliéry zajištěny polykarbonátem. U ptáků vypouštěných do venkovních voliér pouze v teplé části roku, je riziko ptačí chřipky nižší vzhledem k její relativní sezónnosti.

Studentka odpovídala ihned po položení otázek. Používala jak odborné termíny tak i pojmy z chovatelské oblasti. Svoji argumentaci doplňovala o konkrétní případy či zkušenosti.

Body:

Klasifikace: Výborně

Datum obhajoby: 31. 5. 2023

.....
předseda zkušební komise